


Trichocentrum pumilum

Ein extrem kleinblütiges
Trichocentrum



Trichocentrum pumilum,
Zwerg-Maultierohrorchidee
Zeichnung: Jenny Mörth-Kretschmer



Trichocentrum

- **Unterfamilie:**
Epidendroideae LINDLEY, 1821
- **Gattung:**
Trichocentrum POEPP. & ENDL., 1836
- **Art:**
Trichocentrum pumilum (LINDLEY)
M. W. CHASE & N. H. WILLIAMS, 2001
- **Synonyme:**
Oncidium pumilum, *Lophiaris pumila*, *Lophiarella pumila*, *Epidendrum ligulatum*, *Onc. pumilum* var. *angustifolium*, *Onc. pumilum* var. *robustum*, *Onc. pumilum* var. *laxum*, *Oncidium pumilum* var. *megalanthum* und *Onc. minutiflorum*.
- **Deutscher Name:**
Zwerg-Maultierorchidee
- **Herkunft:**
Südamerika: von Brasilien bis Nordostargentinien.
- **Größe:**
Die Bulben erreichen bis 0,9 cm, die Blätter und Blütenstände maximal je 10 cm Länge. Die Blüten erreichen bis 5 mm Durchmesser.
- **Pflege:**
Einmal in der Woche kurz tauchen oder gießen, aufgebundene täglich sparsam besprühen, auch im Sommer. Kultur bevorzugt aufgebunden im kühltemperierten Bereich an einem hellen Standort. Während der kurzen Tageslängen drei bis vier Stunden Kunstlicht (LED-Warmweiß) ergänzen. Hohe Luftfeuchte, Frischluft und Luftumwälzung sind wichtig.
- **Wasser:**
Regen- oder vollentsalztes Sprühwasser, bei Wassermangel auch mineralarmes Mineralwasser.
- **Düngung:**
Dem Sprühwasser einmal alle zwei bis drei Wochen einen verdünnten Orchideendünger zusetzen (s. Text).
- **Vermehrung:**
Durch Teilung alter Pflanzen mit mindestens je drei Bulben oder Aussaat.

Oncidiinae – Teil 5

Gern wird das *Trichocentrum pumilum* als Zwerg-Maultierorchidee bezeichnet. Dies hängt mit der Größe dieser Miniaturorchidee, aber wohl vor allem mit der Blütengröße zusammen. Letztere sind lediglich 3 bis 5 mm groß, bei unseren Pflanzen 2 bis 4 mm. Das Taxon wurde 1825 im 'Bot. Reg.' 11, Seite 920, von dem englischen Botaniker, Gärtner und Orchideeologen John LINDLEY FRS (5.2.1799-1.11.1865) als *Oncidium pumilum* erstbeschrieben. Im Jahr 2001 wurde die Species von dem britisch-US-amerikanischen Botaniker Mark Wayne CHASE (geb. 1951) und dem US-amerikanischen Botaniker Norris H. WILLIAMS (geb. 1943) in die Gattung *Trichocentrum* überführt, was von den beiden Autoren 2001 in der 'Lindleyana' 16, ab Seite 138, veröffentlicht wurde. Beim morphologischen Vergleich beispielsweise mit *Trichocentrum oestlundianum* können wir dieser Klassifizierung folgen. Auch die WCSP (= World Checklist of Selected Plant Families) der Kew Gardens akzeptiert diese Namensgebung. Somit stellt sich die Art taxonomisch wie nachstehend dar:

Familie: Orchidaceae
 Unterfamilie: Epidendroideae
 Tribus: Cymbidieae
 Untertribus: Oncidiinae
 Gattung: *Trichocentrum* POEPP. & ENDL., 1836
 Art: *Trichocentrum pumilum* (LINDL.) M. W. CHASE & N. H. WILLIAMS, 2001 >>



4 x *Trichocentrum pumilum*



Alle Fotos vom 3.6.2020.



Fotos: J. Mörth-Kretschmer



Trichocentrum pumilum